Fisioteca

EXAMEN · FISIOTERAPEUTA

# Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut)

## Convocatoria 2022 · Teórico

72 preguntas
Versión oficial en catalán

Documento oficial publicado por Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut). Fisioteca lo recopila para facilitar tu preparación: las páginas siguientes son el documento original, sin modificaciones.


### Hazlo en modo test

Cronometrado, con corrección al momento, explicación de cada respuesta y repaso de tus fallos.

**www.fisioteca.com**

## Examen del concurs oposició per optar a places de la categoria de fisioterapeuta del Servei de Salut de les Illes Balears

Observacions:

- Aquest qüestionari consta de 72 preguntes en total. De la 61 a la 72 són preguntes de reserva per si alguna de la 1 fins a la 60 resulta impugnada.
- Les pàgines del quadern estan numerades; comprovau-ne el contingut fins a la darrera pàgina. Si detectau alguna anomalia en la impressió del qüestionari, demanau que us el canviïn.
- Per a cada pregunta només hi ha una resposta correcta entre les quatre possibles.
- Cada resposta correcta es valora amb 1 punt, de manera que la valoració total de l'examen és de 60 punts. Cal respondre les preguntes de reserva, encara que en principi només es puntuaran les preguntes 1-60. Cada resposta errònia es penalitza amb una quarta part del valor d'una de correcta. Les respostes en blanc i les que contenguin més d'una alternativa marcada no es valoren.
- **Heu de senyalar les respostes en el full òptic que us han entregat. Llegiu molt atentament les instruccions que hi figuren.**
- El temps per completar la prova és **120 minuts (dues hores), inclòs el temps per senyalar les respostes en el full òptic.**
- Podeu utilitzar el qüestionari com a esborrany. Una vegada acabat l'examen, us el podeu endur.

Advertiments:

- No obriu el qüestionari fins que no us ho indiquin.
- No faceu cap mena de marca ni signatura que pugui desvirtuar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.
- Únicament podeu emprar bolígraf negre o blau.
- No és permès emprar calculadora.
- Durant la prova no podeu dur damunt ni tenir damunt la taula cap aparell electrònic, ni tan sols apagat.
- Abans de començar la prova, algun membre del tribunal o algun dels seus col·laboradors haurà explicat les instruccions. Si no n'heu entès alguna, demanau-li que us l'aclareixi.
- El fet de concórrer a aquesta prova suposa acceptar aquestes instruccions, sense detriment del dret a interposar-hi una reclamació o un recurs.
- Incomplir qualsevol d'aquests advertiments pot suposar l'exclusió de la prova.



Descargado gratis de www.fisioteca.com

Descargado gratis de www.fisioteca.com

1. **A quina llei correspon el Pla Estratègic d'Igualtat d'Oportunitats?**

   *a)* Llei 55/2003, de 16 de desembre.

   *b)* Llei 41/2002, de 14 de novembre.

   *c)* Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

   *d)* Llei 3/2007, de 22 de març.

2. **Com s'anomena la paràlisi que ocasiona la marxa de Trendelenburg?**

   *a)* Paràlisi dels extensors del maluc.

   *b)* Paràlisi del gluti mitjà.

   *c)* Paràlisi del quàdriceps.

   *d)* Paràlisi dels isquiotibials.

3. **En la marxa equina (*steppage*) hi ha un augment...**

   *a)* ...de la flexió del maluc i del genoll.

   *b)* ...de la flexió del genoll i del turmell.

   *c)* ...de l'extensió del maluc i del genoll.

   *d)* ...de l'extensió del maluc i de la flexió del turmell.

4. **Com s'anomena el nombre de passes que es fan en un interval de temps, que generalment s'expressa en passes per minut?**

   *a)* Angle de pas.

   *b)* Longitud de la gambada.

   *c)* Cadència.

   *d)* Període de suport monopodal.

5. **Com s'anomena el mètode d'abordatge de la paràlisi cerebral infantil basat en la locomoció reflexa i l'ontogènesi postural?**

   *a)* Mètode Bobath.

   *b)* Mètode Temple Fay.

   *c)* Mètode Phelps.

   *d)* Mètode Vojta.



Descargado gratis de www.fisioteca.com

6. **Per prevenir el deteriorament de l'estat general d'un ancià són importants determinats aspectes. Senyalau la resposta incorrecta:**

   *a)* L'aportació hídrica i nutritiva.

   *b)* Facilitar l'enllitament prolongat.

   *c)* Les cures posturals.

   *d)* La verticalització.

7. **Quina és la regulació correcta d'un bastó en una persona major?**

   *a)* Quan agafa el bastó ha de tenir les espatles horitzontals i els colzes estesos.

   *b)* Quan agafa el bastó ha de tenir les espatles horitzontals i els colzes flexionats 30°, aproximadament.

   *c)* Quan agafa el bastó ha de tenir les espatles horitzontals i els colzes flexionats 60°, aproximadament.

   *d)* Sempre ha d'emprar un caminador, atès el risc de patir una caiguda.

8. **A quina escala de la mobilitat fa referència la descripció següent? El pacient parteix de la posició d'assegut i s'ha d'aixecar, caminar tres metres, girar-se i tornar a la posició d'assegut. Es cronometra el temps i, si és de més de 20 segons, implica un risc alt de caiguda.**

   *a)* Tinetti.

   *b)* *Timed test up and go*.

   *c)* Test dels cinc metres.

   *d)* *Dual test.*

9. **Quin dels símptomes següents no és característic de la malaltia de Parkinson?**

   *a)* Rigidesa.

   *b)* Tremolor intencional.

   *c)* Cara de màscara.

   *d)* Micrografia.

10. **La radiofreqüència pertany als...**

    *a)* ...corrents de freqüència mitjana.

    *b)* ...corrents de freqüència modulada.

    *c)* ...corrents de freqüència alta.

    *d)* ...corrents de freqüència baixa.



Descargado gratis de www.fisioteca.com

**11. En quina patologia està contraindicada la magnetoteràpia?**

*a)* Bronquitis crònica.

*b)* Tendinitis.

*c)* Micosi.

*d)* Miositis.

**12. Què no inclouen les respostes a l'aplicació de massatge?**

*a)* Augment de la temperatura local.

*b)* Elastificació del teixit connectiu.

*c)* Augment del metabolisme.

*d)* Disminució de l'activitat de les glàndules de secreció.

**13. Quina de les respostes següents no és una contraindicació del massatge?**

*a)* Adherències.

*b)* Inflamacions agudes.

*c)* Flebitis.

*d)* Fragilitat vascular.

**14. Quina de les respostes següents no és una contraindicació absoluta del drenatge limfàtic manual?**

*a)* Infeccions agudes.

*b)* Malalties malignes no tractades.

*c)* Edema cardíac i trombosi venosa profunda.

*d)* Trombosi limfàtica superficial.

**15. Quina de les tècniques següents no es considera termoteràpia?**

*a)* Magnetoteràpia.

*b)* Microones.

*c)* Fangs.

*d)* Ona curta.



Descargado gratis de www.fisioteca.com

**16. Quina de les actuacions següents es troba dins de la intervenció no farmacològica en la malaltia d'Alzheimer?**

*a)* Estimulació cognitiva.

*b)* Teràpia ocupacional.

*c)* Estimulació psicomotriu.

*d)* Totes les respostes anteriors són correctes.

**17. Entre les aplicacions terapèutiques del làser es troben...**

*a)* ...les tendinopaties.

*b)* ...els hematomes.

*c)* ...les úlceres i les ferides cutànies.

*d)* Totes les respostes anteriors són correctes.

**18. Quin tipus d'amputació és l'amputació de Lisfranc?**

*a)* Transmetatarsiana.

*b)* Tarsometatarsiana.

*c)* Mediotarsiana.

*d)* Transmalleolar.

**19. Senyalau la resposta incorrecta:**

**Els exercicis terapèutics són l'execució sistemàtica i planificada de moviments corporals, postures i activitats físiques amb el propòsit que el pacient disposi de mitjans per...**

*a)* ...millorar, restablir o potenciar el funcionament físic.

*b)* ...prevenir alteracions com a objectiu únic.

*c)* ...prevenir o reduir factors de risc per a la salut.

*d)* ...optimitzar l'estat general de salut, el condicionament físic o la sensació de benestar.

**20. Quina és la causa de la incontinència d'esforç?**

*a)* Contracció inadequada del detrusor.

*b)* Alteració dels mecanismes de tancament de la uretra.

*c)* Descoordinació del reflex miccional.

*d)* Disminució de la pressió intraabdominal.



Descargado gratis de www.fisioteca.com

21. **En un tractament uroginecològic, si se cerca la inhibició de la contracció vesical, ¿per mitjà de quin nervi s'ha de fer?**

*a)* Detrusor.

*b)* Tibial anterior.

*c)* Tibial posterior.

*d)* Perineal.

22. **Quina de les patologies següents està englobada dins la síndrome de sensibilitat central?**

*a)* Fibromiàlgia.

*b)* Còlon irritable.

*c)* Migranya.

*d)* Totes les respostes anteriors són patologies englobades dins de la síndrome de sensibilitat central.

23. **Com s'anomena el conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d'activitat de l'empresa per evitar o disminuir els riscs derivats de la feina segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals?**

*a)* Prevenció.

*b)* Protecció de la salut.

*c)* Equips de protecció.

*d)* Avaluació de riscs laborals.

24. **Quan el fisioterapeuta entra a la unitat de cures intensives d'un hospital, ha de localitzar i entendre la informació i la utilitat...**

*a)* ...del monitor de constants vitals.

*b)* ...de les bombes de medicació.

*c)* ...del ventilador mecànic.

*d)* Totes les respostes anteriors són correctes.



Descargado gratis de www.fisioteca.com

**25. Senyalau la resposta correcta amb relació al pacient sedat i no coHaborador en una unitat de cures intensives:**

*a)* No és candidat per fer cap tipus de fisioteràpia, ni motora ni respiratòria, atesa la sedació.

*b)* Cal iniciar el tractament de fisioteràpia sempre que estigui estable hemodinàmicament.

*c)* Se li poden fer mobilitzacions passives, però no fisioteràpia respiratòria.

*d)* Un pacient sedat és indicatiu de mal pronòstic, i per això no se li ha de fer fisioteràpia.

**26. Quina de les proves ortopèdiques següents no s'empra per a una lesió de lligament encreuat anterior?**

*a)* *Jerk test*.

*b)* *Pivot shift*.

*c)* Signe del raspall.

*d)* Prova de Lachman.

**27. Segons la classificació de l'American Spinal Injury Association (ASIA), en les lesions meduHars, quina és la tipus D?**

*a)* Completa. Dèficit motor i sensitiu complet als segments sacres S4-S5. Les possibilitats de recuperació són nulles.

*b)* Incompleta. Dèficit motor complet però associat a un dèficit sensitiu que inclou els segments sacres S4-S5. Les possibilitats de recuperació són del 50 %.

*c)* Incompleta. Hi ha funció motora per davall del nivell de la lesió i almenys la meitat dels músculs tenen un grau de força inferior a 3.

*d)* Incompleta. Hi ha funció motora per davall del nivell de la lesió i almenys la meitat dels músculs tenen un grau de força igual o superior a 3.

**28. Quina de les següents malalties del sistema nerviós central afecta el sistema extrapiramidal?**

*a)* Accident cerebrovascular.

*b)* Malaltia d'Alzheimer.

*c)* Malaltia de Parkinson.

*d)* Demència.



Descargado gratis de www.fisioteca.com

**29. Què és el FEV1, en relació amb les variables d'una espirometria?**

*a)* Representa el volum màxim d'aire exhalat durant una expiració màxima després d'una inspiració màxima.

*b)* Correspon al volum màxim d'aire exhalat al primer segon de l'expiració forçada.

*c)* És el flux expiratori màxim.

*d)* És el volum màxim inspirat en una maniobra d'inspiració forçada després d'una expiració màxima.

**30. Quin nervi està afectat en l'anomenada mà del predicador?**

*a)* Nervi radial.

*b)* Nervi mitjà.

*c)* Nervi cubital.

*d)* Nervi interossi posterior.

**31. Senyalau la resposta correcta respecte de la tècnica de neuromodulació segons Valera i Minaya:**

*a)* L'abordatge òptim per neuromodular el nervi supraescapular es localitza al triangle de Velpeau o espai humerotricipital.

*b)* La neuromodulació percutània és una tècnica invasiva en què s'aplica un corrent de freqüència baixa o mitjana sobre una agulla de punció seca disposada en un punt motor muscular o sobre la projecció d'un nervi perifèric (en algun punt del recorregut) amb un objectiu terapèutic.

*c)* Per neuromodular una afectació sensitiva de la cara anterior del genoll, sense pèrdua de la funció motora, provocada per un pinçament del nervi safè intern, es recomana aplicar corrents de freqüència baixa entre 2 i 5 hertzs.

*d)* Davant d'un problema d'incontinència urinària d'urgència, segons l'evidència científica és preferible aplicar una neuromodulació percutània sobre el nervi tibial posterior que transcutània, ja que arriba a estructures més profundes mitjançant l'agulla i els resultats són millors.

**32. Quina escala cal emprar per classificar la plagiocefàlia postural?**

*a)* Escala de Hazelbaker.

*b)* Escala de Bristol.

*c)* Escala d'Argenta.

*d)* Escala de Braden.



Descargado gratis de www.fisioteca.com

**33. Senyalau la resposta incorrecta amb relació a les lesions de nervis perifèrics:**

*a)* Axonotmesi: no es perd la continuïtat anatòmica del nervi, però aquest presenta interrupcions tant a la mielina com a l'axó.

*b)* Axonopràxia: es perd la continuïtat anatòmica i de la mielina, i s'alteren la sensibilitat i les reaccions autònomes.

*c)* Neurotmesi: en aquesta lesió es perd la continuïtat anatòmica.

*d)* Neuropràxia: es produeix una alteració de la mielina sense pèrdua de continuïtat del nervi. No n'hi ha degeneració.

**34. Què és el més característic de l'espirometria d'una síndrome respiratòria restrictiva?**

*a)* Volum expiratori forçat normal o disminuït.

*b)* Relació de Tiffeneau per davall del 80 %.

*c)* Disminució de la capacitat vital forçada.

*d)* FEV1 normal o disminuït.

**35. Què caracteritza la deformitat del dit en forma de coll de cigne, típica de l'artritis reumatoide de l'adult?**

*a)* Una flexió de la interfalàngica proximal, amb hiperextensió de la interfalàngica distal.

*b)* Posició espontània en flexió de la interfalàngica distal.

*c)* Associa una hiperextensió de la interfalàngica proximal amb una flexió de la interfalàngica distal.

*d)* Cap de les respostes anteriors és correcta.

**36. Quina de les respostes següents és una deformitat característica de l'artritis reumatoide?**

*a)* Nòduls de Heberden.

*b)* Dit de trau o *boutonniere.*

*c)* Nòduls de Bouchard.

*d)* Totes les respostes anteriors són deformitats de l'artritis reumatoide.



Descargado gratis de www.fisioteca.com

**37. En quina patologia reumàtica es troba la troballa radiològica anomenada *columna en canya de bambú*?**

*a)* Artritis reumatoide.

*b)* Espondilitis anquilosant.

*c)* Artrosi del raquis.

*d)* Periarteritis nodosa.

**38. Què indica el resultat positiu en la prova de Jobe?**

*a)* Bursitis subacromial.

*b)* Lesió del supraespinós.

*c)* Luxació acromioclavicular.

*d)* Tendinosi de la porció llarga del bíceps.

**39. Què és una fractura-luxació de Galeazzi?**

*a)* Fractura de la diàfisi proximal del cúbit i luxació distal del cap radial.

*b)* Fractura de la diàfisi del radi i luxació de la radiocubital distal.

*c)* Fractura de la diàfisi del cúbit i luxació distal del radi.

*d)* Fractura de la diàfisi proximal del radi i luxació distal del cap radial.

**40. Amb què està relacionada la maniobra d'Ortolani?**

*a)* Peu equinovar.

*b)* Malaltia de Perthes.

*c)* Epitrocleïtis.

*d)* Luxació congènita del maluc.

**41. La fractura de Bennett és una fractura-luxació...**

*a)* ...del cúbit al nivell de l'olècran.

*b)* ...del cap del radi.

*c)* ...de l'escafoide.

*d)* ...de la base del primer metacarpià.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

**42. Senyalau l'afirmació correcta sobre els mètodes de potenciació muscular:**

*a)* El mètode de Dotte és un mètode dinàmic de càrregues decreixents.

*b)* El mètode de Delorme i Watkins és un mètode dinàmic de càrregues creixents.

*c)* El mètode de McGovern és un mètode dinàmic que es du a terme dins una gàbia de Rocher.

*d)* El mètode de Troisier és un mètode dinàmic de càrregues creixents.

**43. Senyalau l'afirmació incorrecta sobre els avantatges de la coordinació assistencial a l'atenció primària:**

*a)* Millora la disponibilitat de la informació clínica rellevant.

*b)* Redueix el nombre d'hospitalitzacions.

*c)* Promou la discontinuïtat assistencial.

*d)* Augmenta la satisfacció del pacient i dels professionals.

**44. Quines dades no ha de contenir l'informe d'alta?**

*a)* Les dades del pacient.

*b)* Els motius de l'alta.

*c)* Les recomanacions.

*d)* Les dades de la institució receptora.

**45. Senyalau la resposta correcta sobre el cúbit valg:**

*a)* És la inversió i el gir de l'angle format per l'eix de l'avantbraç amb el braç d'uns 5-10º.

*b)* Es dona més sovint que el cúbit var.

*c)* S'hi produeix una desviació lateral de l'avantbraç, per damunt del valg fisiològic d'uns 5-10º.

*d)* No té relació amb les fractures.

**46. Senyalau la resposta correcta sobre els nivells d'evidència de la literatura científica:**

*a)* El nivell 2b correspon a un estudi de cohort grupal.

*b)* L'opinió d'experts es considera una font d'evidència.

*c)* El grau de recomanació D correspon a l'opinió d'experts en anàlisis crítiques.

*d)* El nivell d'evidència 3a correspon a l'estudi de casos i controls individual.



Descargado gratis de www.fisioteca.com

**47. Què és l'elongació muscular?**

*a)* És un tipus de lesió greu.

*b)* És un tipus de lesió maligna.

*c)* És un tipus de lesió lleu.

*d)* És un tipus de lesió de pronòstic dolent.

**48. Com ha de ser un pla d'actuació per a un pacient?**

*a)* Organitzat i individualitzat.

*b)* Orientat a objectius.

*c)* Individualitzat.

*d)* Totes les respostes anteriors són correctes.

**49. Pel que fa a la contracció muscular, ¿a què fa referència la relació «força = resistència»?**

*a)* Contracció isotònica concèntrica.

*b)* Contracció isocinètica.

*c)* Contracció isomètrica.

*d)* Contracció isotònica excèntrica.

**50. Què s'està avaluant si se situa el pacient estirat en decúbit pron, el cap queda per fora de la llitera, els braços al llarg del tronc recolzats a la llitera i amb una mà s'exerceix resistència sobre l'occipital i amb l'altra s'estabilitza el cap en doble mentó?**

*a)* Els músculs esternoclidomastoïdal i l'escalè anterior i posterior.

*b)* La musculatura flexora cervical, els escalens i l'esternoclidomastoïdal, fins i tot el múscul accessori oblic inferior.

*c)* La musculatura extensora cervical transversa del coll, el digàstric del clatell, l'iliocostal cervical i l'espleni del coll.

*d)* La musculatura rotatòria cervical transversa del coll, el digàstric del clatell, l'espleni del coll i els escalens anteriors.



Descargado gratis de www.fisioteca.com

**51. El pla transversal és el que divideix el cos en part superior i part inferior. L'eix de moviment és el longitudinal, que permet els moviments...**

*a)* ...de flexió i extensió.

*b)* ...d'abducció i adducció.

*c)* ...de rotació interna i externa.

*d)* ...de flexió i extensió lateral.

**52. A quins factors respon la delimitació de les àrees de salut?**

*a)* Geogràfics i demogràfics.

*b)* Socioeconòmics.

*c)* Epidemiològics.

*d)* Totes les respostes anteriors són correctes.

**53. Per què és especialment important la família en l'àmbit de la fisioteràpia comunitària?**

*a)* Només pot determinar la salut d'un dels integrants, cosa que és important per als altres.

*b)* És un nucli generador d'hàbits no saludables, però no d'hàbits saludables.

*c)* Pot influir en les creences, els comportaments i les actituds.

*d)* Encara que no és una font d'atenció sanitària, sí que pot ser una font de malaltia.

**54. Quan es tracta d'un dolor agut?**

*a)* Quan té una durada de més de sis mesos.

*b)* Quan té una durada de menys de sis mesos.

*c)* Quan té una durada de més de dotze mesos.

*d)* Totes les respostes anteriors són correctes.

**55. Quina d'aquestes modalitats no és cinesiteràpia passiva forçada mantinguda?**

*a)* Estiraments musculars.

*b)* Manipulacions.

*c)* Traccions.

*d)* Mobilitzacions analítiques específiques.



Descargado gratis de www.fisioteca.com

**56. Quin d'aquests tipus d'articulació pot desenvolupar moviment en els tres plans de l'espai?**

*a)* Condília.

*b)* Enartrosi.

*c)* Trocoidal.

*d)* Troclear.

**57. En quina modalitat de suspensoteràpia s'afegeix un component de tracció axial?**

*a)* Suspensió excentrada.

*b)* Suspensió pendular descentrada.

*c)* Suspensió axial concèntrica.

*d)* Suspensió axial excèntrica lateral.

**58. De quin tipus de mobilització es tracta si s'aplica un muntatge de teràpia amb politges, en què es mobilitza una extremitat superior en flexió glenohumeral per mitjà d'una extensió glenohumeral de l'extremitat superior contralateral?**

*a)* Autoassistida homòloga simètrica.

*b)* Autoassistida homòloga asimètrica.

*c)* Autoassistida homòloga simètrica mixta.

*d)* Autoassistida homòloga asimètrica mixta.

**59. Com s'anomena l'estructura fonamental del sistema sanitari per la qual les comunitats autònomes delimiten i constitueixen demarcacions al seu territori?**

*a)* Àrea de salut.

*b)* Zona de salut.

*c)* Comarca sanitària.

*d)* Gerència de salut.



Descargado gratis de www.fisioteca.com

**60. En el sistema de banderes es poden distingir dos grans grups: banderes clíniques i banderes psicosocials. A quina valoració correspon el concepte de *bandera groga*?**

*a)* Psicosocial.

*b)* Clínica.

*c)* Les respostes *a)* i *b)* són correctes.

*d)* Les respostes *a)* i *b)* són incorrectes.

## Preguntes de reserva

**61. Què es pot observar en una radiografia si un infant amb paràlisi cerebral espàstica té el maluc luxat o subluxat?**

*a)* La línia de Shenton discontínua o trencada.

*b)* L'horitzontalització de la línia de Perkins.

*c)* La línia de Sherton paral·lela a la línia H (de Hilgenreiner).

*d)* El cap femoral situat al quadrant superior intern del quadrat de Perkins.

**62. La classificació IASP (International Association for the Study of Pain) sobre dolor crònic el divideix en set subgrups. Quin dels grups següents no pertany a aquesta classificació?**

*a)* Dolor crònic primari.

*b)* Dolor crònic postquirúrgic o posttraumàtic.

*c)* Dolor crònic psicològic.

*d)* Dolor crònic musculoesquelètic.

**63. Quina de les respostes següents és un dels factors que predisposen a desenvolupar una escoliosi?**

*a)* Genoll valg unilateral de 40° no corregit amb una ortesi.

*b)* Reflex de Galant no integrat correctament.

*c)* Les respostes *a)* i *b)* són correctes.

*d)* Totes les respostes anteriors són incorrectes.



Descargado gratis de www.fisioteca.com

**64. Quines premisses d'estabilitat ha de complir el pacient crític coHaborador per iniciar el tractament de fisioteràpia?**

*a)* Relació entre la pressió parcial d'oxigen arterial i la fracció inspirada d'oxigen (PAFI) superior a 300 amb suport vasopressor i temperatura corporal superior a 38,5 °C.

*b)* $FiO_2$ inferior a 0,6, variacions de pressió sanguínia inferiors al 20 % i patró respiratori correcte.

*c)* Freqüència cardíaca en repòs inferior al 50 % del màxim per edat, PEEP superior a 16 i temperatura corporal superior a 38,5 °C.

*d)* Simplement s'ha de tenir l'autorització del metge.

**65. Senyalau l'afirmació correcta sobre la PEEP en un pacient respiratori:**

*a)* Només es pot programar en mode baromètric.

*b)* Ajuda a mantenir els alvèols reclutats.

*c)* La PEEP habitual se situa entre 8 i 14 cm $H_2O$.

*d)* Totes les respostes anteriors són falses.

**66. Què significa *prosopagnòsia*?**

*a)* Incapacitat per reconèixer els dèficits provocats per la malaltia.

*b)* Incapacitat per orinar.

*c)* Incapacitat per mantenir l'estructura corporal en sedestació.

*d)* Incapacitat per reconèixer cares de persones familiars.

**67. Com es defineix clàssicament la insuficiència respiratòria en repòs, vigília i respirant aire ambient?**

*a)* Pressió arterial d'oxigen inferior a 60 mmHg i $PCO_2$ superior a 45 mmHg.

*b)* Pressió arterial d'oxigen inferior a 60 mmHg i $PCO_2$ inferior a 45 mmHg.

*c)* Pressió arterial d'oxigen superior a 60 mmHg i $PCO_2$ inferior a 45 mmHg.

*d)* Cap de les respostes anteriors és correcta.



Descargado gratis de www.fisioteca.com

**68. Què caracteritza la síndrome de Klippel-Feil?**

*a)* Presència d'una costella cervical.

*b)* Estenosi raquídia.

*c)* La formació d'un bloc vertebral per la fusió de diverses vèrtebres cervicals.

*d)* Totes les respostes anteriors són correctes.

**69. A què es refereix la triangulació en la recerca qualitativa?**

*a)* A un procediment de recollecció de dades.

*b)* A un sistema d'anàlisi de dades.

*c)* A un mode de mostreig no intencional.

*d)* A una estratègia per assegurar el rigor de la recerca.

**70. Com defineix l'OMS el concepte d'*equip de salut*?**

*a)* Associació no jerarquitzada de persones amb diferents disciplines professionals però amb un objectiu comú, que és proveir en qualsevol àmbit els pacients i les seves famílies de l'atenció de salut més integral possible.

*b)* Associació jerarquitzada de persones amb diferents disciplines professionals però amb un objectiu comú, que és proveir en qualsevol àmbit els pacients i les seves famílies de l'atenció de salut més integral possible.

*c)* Associació no jerarquitzada de persones amb diferents disciplines professionals amb múltiples objectius per proveir en qualsevol àmbit els pacients de l'atenció de salut dependent de cada disciplina.

*d)* Associació jerarquitzada de persones amb la mateixa disciplina professional però amb un objectiu comú, que és proveir en qualsevol àmbit els pacients i les seves famílies de l'atenció de salut més integral possible.

**71. A quin nivell es fa l'amputació de Syme clàssica i modificada?**

*a)* Desarticulació de turmell o transmalleolar i supramalleolar.

*b)* Transmetatarsiana i mediotarsiana.

*c)* Transmetacarpiana i interfalàngica.

*d)* Totes les respostes anteriors són incorrectes.



Descargado gratis de www.fisioteca.com

GOIB

**72. En els tractaments a l'UCI s'ha de consultar amb l'intensivista en les situacions considerades de bandera vermella. Quina de les respostes següents és de bandera vermella en pacients adults?**

*a)* Fractures inestables.

*b)* Pressió intracranial entre 10 i 15 mmHg.

*c)* PEEP superior o igual a 10 cm $H_2O$.

*d)* Freqüència respiratòria superior a 30 rpm.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

Descargado gratis de www.fisioteca.com