Fisioteca

EXAMEN · FISIOTERAPEUTA

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O)

Convocatoria 2020 · Teórico

110 preguntas

Documento oficial publicado por Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O). Fisioteca lo recopila para facilitar tu preparación: las páginas siguientes son el documento original, sin modificaciones.

Hazlo en modo test

Cronometrado, con corrección al momento, explicación de cada respuesta y repaso de tus fallos.

www.fisioteca.com

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN DE 24 PUESTOS DE FISIOTERAPEUTA, DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA, Y PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS SELECTIVAS, DE LISTAS DE PERSONAS ASPIRANTES AL DESEMPEÑO DE DICHOS PUESTOS DE TRABAJO TANTO MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL COMO POR PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL.

(Aprobada por Resolución 695E/2020, de 18 de agosto, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 209 de 16 de septiembre de 2020).

EJERCICIO CUESTIONARIO DE PREGUNTAS TIPO TEST

26 DE MARZO DE 2021

NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE

MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR

Descargado gratis de www.fisioteca.com

Descargado gratis de www.fisioteca.com

1.- Según el artículo 9 del "Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra", La condición de funcionario se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos. Señale la respuesta incorrecta.

a) Superación de las correspondientes pruebas selectivas.

b) Nombramiento conferido por la autoridad competente que deberá publicarse en el "Boletín Oficial de Navarra".

c) Juramento o promesa de respetar el régimen foral de Navarra, de acatar la Constitución y las leyes y de cumplir fielmente las obligaciones propias del cargo.

d) Toma de posesión dentro del plazo de dos meses, a contar desde la notificación del nombramiento, salvo causa suficientemente justificada.

2.- Según establece el artículo 40 de la "Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en las materias que sean competencia exclusiva de Navarra, corresponden a la Comunidad Foral las siguientes potestades. Señale la respuesta incorrecta.

a) Reglamentaria
b) Legislativa.
c) Judicial
d) Administrativa, incluida la inspección.

3.- Según establece el artículo 15 de la "Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales", el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales. Señale la respuesta incorrecta.

a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Los trabajadores pedirán las debidas instrucciones al empresario.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

4.- Según el artículo 5 de la "Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud", los ciudadanos residentes en Navarra son titulares y disfrutan con respecto al sistema sanitario de la Comunidad Foral de los siguientes derechos. Señale la respuesta incorrecta.

a) A una asistencia dirigida a facilitar la reinserción biopsicosocial.
b) A la información sobre los servicios sanitarios a que pueden acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso.
c) A Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento.
d) A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y estancia en centros sanitarios públicos y privados.

5.- Según el artículo 16 de la "Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud", la atención primaria de salud se presta a través de las Estructuras de Atención Primaria que, sobre la base del trabajo en equipo y con la participación activa de la población, llevarán a cabo, en el marco territorial de su Zona Básica de Salud, las siguientes acciones. Señale la respuesta incorrecta.

a) Asistencia sanitaria primaria individual tanto en régimen ambulatorio como domiciliario y de urgencias.
b) Actividades orientadas a la promoción de la salud, a la prevención de las enfermedades y a la reinserción social.
c) Actividades de educación sanitaria de la población, de docencia y de investigación.
d) El apoyo y la colaboración en la elaboración y ejecución de los programas asistenciales de los equipos de atención primaria, principalmente mediante la formación continuada, la interconsulta y la protocolización de los procesos.

6.- Según el artículo 3 de la "Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de Derechos y Deberes de las personas en materia de Salud en la Comunidad Foral de Navarra", los principios generales sobre los que se sustentan los derechos y deberes de las personas en materia de salud en la comunidad Foral de Navarra son los siguientes. Señale la respuesta incorrecta.

a) La participación de las personas en las actuaciones sanitarias relacionadas con su salud.
b) La garantía a la información y documentación clínica de determinados documentos.
c) El respeto a la autonomía de la voluntad del paciente.
d) La calidad y seguridad de los servicios y prestaciones sanitarias.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

7.- Según el artículo 18 de la "Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de Derechos y Deberes de las personas en materia de Salud en la Comunidad Foral de Navarra", derecho a la asistencia sanitaria de calidad humana y científica. Señale la respuesta correcta.

a) A las medidas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, así como a acciones de educación sanitaria.
b) El respeto a la autonomía de la voluntad del paciente.
c) Se garantizará a las personas ingresadas el derecho a la planificación del alta, de forma que en el caso de requerir cuidados con posterioridad al alta, se garanticen estos cuidados.
d) A la información epidemiológica y sobre programas y acciones de prevención.

8.- Según el artículo 24 de la "Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres", las Administraciones públicas de Navarra garantizarán en materia de gestión de personal. Señale la respuesta incorrecta.

a) La elaboración de planes de igualdad del personal a su servicio de acuerdo con la normativa que les es de aplicación. Los planes se evaluarán una sola vez.
b) La implantación de medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
c) Elaboración de protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo.
d) La formación específica en materia de igualdad entre mujeres y hombres y gestión del personal al personal encargado de la misma.

9.- Según el artículo 27 de la "Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres", los poderes públicos deben llevar a cabo acciones concretas con la finalidad de: Señale la respuesta incorrecta:

a) Dinamizar el tejido asociativo femenino y promover la creación de redes.
b) Reconocer e incorporar en la agenda política las aportaciones que hacen las asociaciones de mujeres y grupos feministas.
c) Impulsar la participación de las mujeres, del movimiento feminista y de las entidades de mujeres en los órganos consultivos.
d) Impulsar las aportaciones de las mujeres en el ámbito del cambio climático.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

10.- Según el artículo 39 de la Ley" Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres". Igualdad en la cultura, corresponde a las Administraciones Públicas de Navarra llevar a cabo las siguientes actuaciones. Señale la respuesta correcta.

a) Las Administraciones Públicas promoverán una educación no formal que garantice el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
b) Impulsar la recuperación de la memoria histórica de las mujeres y la promoción de políticas culturales que hagan visibles sus aportaciones al patrimonio y a la cultura de Navarra.
c) El Gobierno de Navarra promoverá contenidos creados por mujeres en el ámbito de la sociedad de la información y del conocimiento.
d) Las Administraciones deportivas navarras realizarán acciones de sensibilización y difusión del deporte femenino que promuevan referentes de mujeres en todas las disciplinas.

11.- La inclinación de la pierna hacia dentro en relación al pie considerado fijo tiene cuatro consecuencias. Señale la respuesta INCORRECTA:

a) Rotación interna de la pierna sobre el pie.
b) Abducción-supinación del retropié.
c) Aducción-pronación del antepié.
d) Ahondamiento del arco interno.

12.- Señala la respuesta INCORRECTA. En relación a la articulación temporomandibular:

a) Los movimientos de propulsión/retropulsión se efectúan sobretodo en la articulación meniscotemporal.
b) En la articulación temporomeniscal, en el movimiento de descenso de la mandíbula, el cóndilo se desplaza hacia delante y arrastra con él al menisco.
c) En el músculo pterigoideo lateral: para explorar el punto gatillo se realiza una palpación intraoral, lo más arriba posible de la apófisis coronoides, presionando hacia dentro, hacia la lámina lateral de la apófisis pterigoides, donde se palpa el vientre de la división inferior del músculo.
d) En el músculo pterigoideo lateral: la hipersensibilidad a la palpación de las fibras cerca de la inserción en el cuello del cóndilo, se puede poner de manifiesto al parparlo externamente con los maxilares separados unos 3 cm.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

13.- Según Kapandji, en relación a la dirección de los ligamentos cruzados de la rodilla. Señale la respuesta INCORRECTA:

a) En el plano frontal, el ligamento cruzado posterointerno, es oblicuo hacia arriba y hacia dentro.
b) En el plano sagital, el ligamento cruzado anteroexterno, es oblicuo hacia arriba y hacia atrás.
c) El ligamento cruzado anteroexterno se cruza con el ligamento lateral interno de la misma rodilla.
d) Con la rodilla en extensión, el ligamento cruzado anteroexterno es más vertical mientras el ligamento posterointerno es más horizontal.

14.- En el complejo osteomuscular esternocostoclavicular. Señale la respuesta FALSA:

a) En el vendaje funcional recomendado para subluxaciones esternoclaviculares, colocaremos una tira de tape que se fija en la región dorsal del mismo lado y se ancla en la región pectoral contraria a la lesión. La siguiente tira va en sentido contrario y descendente: se fija en la clavícula no lesionada y se ancla en la región pectoral del lado lesionado.
b) En el plano vertical, la clavícula tiene una amplitud de movimiento de elevación de 10 centímetros y 3 cm de descenso.
c) En el plano horizontal, la clavícula tiene limitada la retroposición por el ligamento costoclavicular y el ligamento posterior esternoclavicular.
d) En el plano horizontal, la clavícula tiene una amplitud de movimiento de 5 cm de anteposición en la porción externa de la clavícula y 3 cm de retroposición de la porción interna de ésta.

15.- Señale la respuesta INCORRECTA. En el complejo musculoarticular de la rodilla:

a) En la flexión de la rodilla, en la rotación interna de la tibia respecto al fémur, se distiende el ligamento cruzado posterointerno y se tensa el anteroexterno así como su expansión al cuerno anterior del menisco interno que se desplaza hacia atrás.
b) En 90º de flexión de rodilla, a partir de los 20º de rotación externa de la tibia sobre el fémur, el ligamento cruzado anteroexterno se tensa.
c) La eficacia del recto anterior como extensor de rodilla aumenta con la extensión de la cadera.
d) En la Prueba de Payr, con rotación interna de tibia sobre fémur, el dolor de la interlínea interna indica trastorno del cuerno anterior del menisco interno.

16.- Según el método Bobath, la parte estabilizada del cuerpo contra o alrededor de la que puede efectuarse un movimiento de otra o varias partes del cuerpo, se denomina:

a) Postural Set.
b) Punto de referencia.
c) Punto clave del control.
d) Reacciones asociadas.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

17.- Una de las principales vías ascendentes es la de Cordones Dorsales: Fascículo Grácil y Fascículo cuneiforme. Señale la afirmación correcta:

a) Transportan la información relacionada con la propiocepción y el tacto discriminativo.
b) El Fascículo Grácil está formado por fibras que se unen a la médula en la región torácica superior y cervical.
c) El Fascículo cuneiforme recoge sus fibras en la región sacra, lumbar y torácica inferior.
d) Todas las afirmaciones son correctas.

18.- Respecto al método de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (método Kabat), la técnica cuyo objetivo es activar el control de movimiento, mejorar la fuerza, la estabilidad del segmento y la coordinación del segmento que se trabaja mediante el uso de contracciones concéntricas de estabilización y excéntricas sin permitir la relajación muscular entre ellas, se denomina:

a) Iniciación rítmica.
b) Combinación de movimientos isotónicos.
c) Elongaciones repetidas rápidas.
d) Estabilizaciones rítmicas.

19.- Señale la respuesta INCORRECTA. En la muñeca:

a) El orden de los tendones palpables en la región anterior es de radial a cubital: 1. Flexor radial del carpo, 2. Palmar mayor, 3. Flexor común superficial de los dedos, 4. Flexor cubital del carpo.
b) La prueba de Ochsner permite detectar una lesión del nervio radial.
c) Para resaltar y poder palpar el tendón del músculo Palmar largo, solicitamos una oposición entre el pulgar y el meñique.
d) Para palpar el tendón del índice del músculo Flexor común superficial de los dedos, solicitamos una oposición entre el pulgar y el índice.

20.- ¿Cuál NO es un objetivo de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) propuesto por la OMS?

a) Proporcionar una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y los estados relacionados con ella, los resultados y los determinantes.
b) Proporcionar un protocolo para el diagnóstico de discapacidades que permitan el diseño de políticas sanitarias internacionales.
c) Permitir la comparación de datos entre países, entre disciplinas sanitarias, entre los servicios y en diferentes momentos a lo largo del tiempo.
d) Proporcionar un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado en los sistemas de información sanitaria.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

21.- ¿Cuál de los siguientes signos no corresponde al Síndrome Parkinsoniano?

a) Bradicinesia.
b) Espasticidad.
c) Temblor en reposo.
d) Postura de simio.

22.- ¿Qué define el término "alodinia"?

a) Respuesta dolorosa exagerada a una sensación dolorosa normal.
b) Aumento de la sensibilidad a la estimulación.
c) Dolor provocado por un estímulo habitualmente inocuo.
d) Sensación desagradable anómala.

23.- Cuando hablamos de una lesión medular incompleta ASIA C, quiere decir que:

a) La función sensitiva, pero no la motora, está preservada por debajo del nivel neurológico e incluye el segmento sacro S4-S5.
b) La función motora está preservada por debajo del nivel neurológico y más de la mitad de los músculos principales, por debajo del nivel neurológico, tienen una puntuación muscular inferior a 3.
c) La función motora está preservada por debajo del nivel neurológico y al menos la mitad de los músculos principales, por debajo del nivel neurológico, tienen una puntuación muscular igual a 3 o superior.
d) La función motora y sensorial es normal.

24.- Respecto al músculo coracobraquial, señale la respuesta correcta:

a) Se origina en el vértice de la apófisis coracoides de la escápula y se inserta en la superficie medial de la tuberosidad del radio.
b) Realiza una función de flexor de antebrazo.
c) Pasa por la axila y es perforado e inervado por el nervio musculocutáneo.
d) Todas las respuestas son correctas.

25.- En un accidente cerebrovascular isquémico, según la Clasificación *Ictus Oxforshire Community Stroke*, cuando se presenta un infarto completo en la circulación anterior (TACI), el paciente muestra los siguientes síntomas:

a) Deficiencias en el habla, hemianopsia homónima y déficit sensitivomotor grave en cara, brazo, tronco y pierna.
b) Deficiencias motoras puras en cara, brazo, tronco y pierna.
c) Deficiencias sensitivas puras en cara, brazo, tronco y pierna.
d) Hemianopsia homónima aislada.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

26-. Indica cuál es la respuesta FALSA sobre el tratamiento de una prótesis total de cadera en fase aguda:

a) Se realizarán isométricos de cuádriceps.
b) Se movilizará la articulación coxofemoral.
c) Se iniciará la marcha con una muleta y carga total.
d) Se potenciarán progresivamente los abductores de la cadera.

27.- ¿Cuál es la escala que podemos utilizar para diferenciar un dolor neuropático de un dolor nociceptivo?

a) McGill
b) EVA
c) DN4
d) Todas son falsas

28.- Los fenómenos de turbulencia aparecen a partir de una velocidad umbral que varía en función de la viscosidad del fluido. Señale la respuesta CORRECTA:

a) Durante el desplazamiento de un objeto en el agua, se establece una diferencia de presión entre la parte delantera y trasera. De ello, resulta un movimiento de agua hacia delante con un fenómeno de depresión y de aspiración con turbulencias.
b) La ola de inicio es responsable de una presión positiva por delante del objeto en movimiento que se opone a su avance.
c) La estela es provocada por el flujo de agua y crea turbulencias de presión positiva que tiran del objeto hacia delante.
d) Los remolinos se forman en la aspiración, en parte sobre los bordes y en parte detrás del objeto.

29.- ¿Qué movimiento realiza el paciente cuando queremos valorar un estrechamiento del agujero intervertebral y una irritación de las raíces nerviosas a nivel cervical?

a) Paciente en sedestación, gira e inclina la cabeza hacia un lado mientras realiza una ligera inclinación hacia atrás.
b) Paciente en bipedestación, gira e inclina la cabeza hacia un lado mientras realiza una máxima inclinación hacia atrás.
c) Paciente en bipedestación, gira e inclina la cabeza hacia un lado mientras realiza una flexión máxima.
d) Todas son falsas.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

30.- En el examen funcional de los pacientes afectados de artritis reumatoide, el cuestionario que objetiva la medición de los resultados de la prensión se denomina:

a) Índice funcional de Steinbrocker
b) Índice funcional de Lee.
c) Test de Sollerman.
d) Todas las respuestas son correctas.

31.- En las úlceras por presión, cuando encontramos eritema persistente con o sin flictena o induración (desprendimiento de la epidermis e infiltración tisular) se trata de:

a) UPP grado 1.
b) UPP grado 2.
c) UPP grado 3.
d) UPP grado 4.

32.- Señale la respuesta INCORRECTA. En la mano:

a) El oponente del pulgar es inervado por la rama recurrente del nervio mediano.
b) La hipersensibilidad profunda a la presión en el primer espacio interdigital puede ser referida por escalenos, braquial, supinador, extensor radial largo del carpo o braquiorradial.
c) Los puntos gatillo activos del músculo oponente del pulgar se identifican con la palpación plana a través de la dirección de fibras musculares sobre la eminencia tenar.
d) El signo de Froment nos indica afectación del nervio mediano.

33-. En relación al empleo de toxina botulínica, señale la respuesta CORRECTA:

a) La toxina botulínica es una neurotoxina sintetizada por una bacteria anerobia llamada Bacillus Botulinum Perfringens.
b) Se conocen siete serotipos de los cuales, los serotipos C y D se consideran responsables del botulismo.
c) Algunas de las aplicaciones clínicas de la toxina botulínica son el blefaroespasmo, tics, estrabismo y migraña.
d) Todas son correctas.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

34.- Según C.Walker, la visita al fisioterapeuta para la rehabilitación post-parto deberá realizarse en la siguiente semana desde el nacimiento del bebé:

a) A las 6 semanas.
b) A las 4 semanas y media.
c) A las 7 semanas.
d) Ninguna respuesta es correcta.

35.- Dentro de los síntomas del síndrome de dolor miofascial masticatorio según "O. Mayoral", señale la respuesta incorrecta:

a) Dolor craneal.
b) Tinnitus.
c) Vértigos.
d) Cefaleas.

36.- Señale cuál es la respuesta incorrecta sobre las contraindicaciones de la hidroterapia:

a) Insuficiencia cardiaca.
b) Miositis.
c) Reumatismos inflamatorios en fase aguda.
d) Coronopatías.

37.-Señale cuál no es una ortesis antiequina:

a) Muelle de Codivilla.
b) Bitutor tipo ISNY.
c) Antiequino espiral de plexidur.
d) Bitutor tipo Klenzack.

38.- Con respecto a los encajes en las prótesis para amputados por debajo de la rodilla, señale la respuesta incorrecta:

a) Encaje PTS.
b) Encaje TSB.
c) Encaje OTTO-BOCK.
d) Encaje KBM.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

39.- En el método de fortalecimiento muscular "ZINOVIEFF", señale la respuesta incorrecta:

a) Utiliza cargas progresivamente decrecientes.
b) Se utiliza la 10 R.M (dinámica)
c) Comprende 5 series de 10 ejercicios.
d) Es llamado también "Oxford técnica".

40.- Con respecto a las precauciones de los ultrasonidos, según "R. Martin", señale cuál es la respuesta correcta:

a) En zonas de tromboflebitis.
b) En fracturas recientes con callos incipientes.
c) Endoprótesis.
d) Ninguna respuesta es correcta.

41.- Según "M. Le Métayer", qué parámetro de la evolución de la motricidad manual del niño es correcto:

a) 12 meses: coge un objeto pequeño entre el pulgar y el índice.
b) 14 meses: mete un objeto en un recipiente.
c) 15 meses: realiza una torre de 2 cubos.
d) Todas las respuestas son correctas.

42.- Con respecto a los determinantes de la marcha, señale la respuesta correcta:

a) La pelvis rota hacia adelante en el plano horizontal 6º a cada lado de la línea central, cuando el centro de gravedad está en el punto inferior de la trayectoria de la curva.
b) Tras el apoyo de talón, la rodilla se flexiona unos 25º, lo cual desciende 5 mm el centro de gravedad en su punto máximo.
c) La estrecha base de sustentación, entre 10 y 15 cm, reduce el desplazamiento lateral del centro de gravedad.
d) Durante la marcha, la pelvis desciende hacia el lado de la pierna oscilante mientras que la pierna que soporta el peso entra en aducción conforme la pelvis se desplaza hacia ella, para reducir la elevación del centro de gravedad en 3 mm.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

43.- Con respecto a la articulación acromioclavicular, señale la respuesta incorrecta:

a) Es una articulación tipo artrodia.
b) Está estabilizada por los ligamentos acromioclaviculares y esterno-claviculares.
c) Los ligamentos conoide y trapezoide son importantes en la transmisión de fuerzas de la escápula a la clavícula.
d) Esta articulación está mecánicamente ligada a la articulación esternocostoclavicular.

44.- Durante la realización de la maniobra de evacuación o de llamada según "Leduc", señale la respuesta correcta:

a) La mano está en contacto con la piel por el borde cubital del 5º dedo.
b) La presión se realiza durante la abducción del codo.
c) Los movimientos del hombro y el codo son reducidos.
d) Todas las respuestas son correctas.

45.- Según G.S.Kolt,en la inestabilidad anteroinferior del hombro de nadador, señale la respuesta falsa:

a) Prueba de aprensión anterior positiva.
b) Aumento de la movilidad en las pruebas de traslación.
c) La rotación interna desde la abducción y rotación externa provoca un chasquido anterior relacionado con la interposición del rodete glenoideo dañado.
d) Dolor y chasquido con la rotación interna en abducción de 90º.

46.- Señale la respuesta correcta con respecto a los músculos prevertebrales según "Genot":

a) El largo del cuello se extiende desde la cara anterior de los cuerpos vertebrales desde el atlas hasta la 3ª vértebra dorsal.
b) Los esternocleidomastoideos conectan la línea curva inferior del occipital, la clavícula, la mastoides y el esternón.
c) El milohioideo se extiende desde el maxilar superior al hueso hioides.
d) Todas las respuestas son correctas.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

47.- En la postura lordótica, según "Kendall", señale la respuesta correcta:

a) Extensión articulación cadera.
b) Retracción extensores de cadera.
c) Retracción de abdominales.
d) Todas las respuestas son falsas.

48.- Según las pruebas clínicas de "Klaus Buckup", señale la respuesta correcta:

a) La prueba de "springing test", valora el dolor sacroilíaco.
b) El "signo de Hoover" valora la articulación sacroilíaca.
c) El "standing flexion-test" es una prueba funcional de la articulación sacroilíaca.
d) "Prueba de Laguerre" hace un diagnóstico diferencial entre el dolor con origen en la articulación coxofemoral y el dolor lumbar.

49.- Según D. Butler, las adiciones de sensibilización utilizadas en el "test de elevación de la pierna estirada", todas son correctas, excepto una:

a) Aducción de la cadera.
b) Rotación externa de la cadera.
c) Inversión plantar de tobillo.
d) Flexión dorsal del tobillo.

50.- Con respecto al Síndrome de Guillain Barré según "P. Downie", señale la respuesta correcta:

a) Se trata de una polineuropatía sensitivomotora subaguda.
b) Los síntomas motores comienzan proximalmente y avanzan distalmente.
c) Existe una debilidad simétrica de los músculos.
d) Los músculos del tronco son los primeros en afectarse.

51.- Señale la respuesta correcta sobre el nervio obturador según "H. Rouvière":

a) Está formado por la unión de las ramas anteriores de los nervios L3-L4-L5.
b) Penetra en el conducto suprapubiano.
c) Se divide en dos ramas terminales: anterior y posterior.
d) Todas las respuestas son correctas.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

52.- En el estiramiento de la unidad miotendinosa según "H.Neiger", señale la respuesta incorrecta:

a) Se produce en primer lugar un alargamiento de la parte contráctil y de las capas conjuntivas.
b) La importancia del alargamiento depende del esfuerzo de tracción aplicado a la unidad miotendinosa.
c) Cuando el músculo estirado está en un estado de contracción previa, la amplitud del alargamiento es mayor.
d) Las estructuras tendinosas se solicitan en alargamiento sólo cuando la fuerza reactiva interna es suficiente.

53.- En la prueba funcional de Bunnell según "Klaus Buckup", se valora:

a) Alteración congénita en la formación del tendón del musculo flexor largo del pulgar.
b) Indica una contractura de la musculatura interna de la mano debido a una isquemia.
c) Determina una tenosinovitis del tendón del abductor corto del pulgar.
d) Indica una alteración de la articulación trapezometacarpiana.

54.- Sobre las vías linfáticas según Leduc, señale la respuesta incorrecta:

a) Los capilares linfáticos están dispuestos en forma de dedos de guante, es decir, en un sistema tubular cerrado.
b) Los precolectores son valvulados.
c) El canal torácico mide de 12 a 15 mm de diámetro.
d) Los colectores están provistos de una musculatura propia que somete los vasos a importantes contracciones.

55.- Durante el volteo reflejo según Vojta, señale la respuesta incorrecta:

a) El estímulo reflejo se sitúa en la línea mamilar, sobre el séptimo espacio intercostal.
b) La cabeza se vuelve hacia el lado de la estimulación.
c) El abdomen y las piernas se flexionan.
d) El brazo facial se extiende.

56.- Señale cuál no es una "banda de atrapamiento" según "A. Pilat".

a) Banda inguinal.
b) Banda crural.
c) Banda ocular.
d) Banda del mentón.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

57.- Señale la respuesta incorrecta en cuanto a la artrogriposis múltiple congénita (AMC):

a) Es un síndrome neuromuscular no progresivo.
b) La lesión suele producirse durante el segundo trimestre de gestación.
c) Algunos niños con AMC proceden de embarazos con hidramnios.
d) Existen anomalías asociadas como la fisura palatina, lesiones cardiacas y malformaciones de la zona urinaria.

58.- Señale la respuesta correcta en cuanto al niño prematuro:

a) Presenta hipotonía global.
b) Los reflejos primitivos están ausentes.
c) Las extremidades del niño se colocan típicamente en extensión y abducción con disminución del patrón flexor y orientación a la línea media.
d) Las respuestas a y c son correctas.

59.- Según Kendall's la respuesta correcta respecto a la puntuación de la fuerza muscular es:

a) Grado bien: el musculo es capaz de mantener su posición frente a una presión intensa.
b) Grado regular: el musculo es capaz de completar su amplitud de movimiento en el plano horizontal.
c) Grado mal: se refiere a la ausencia de indicios visibles o palpables de la contracción muscular.
d) Grado traza: se aprecia una débil contracción del musculo que puede palparse aunque no existe ningún movimiento visible en la región.

60.- En fisioterapia aplicada a los ancianos con patología traumatológica y ortopédica, son metas generales del tratamiento y del plan de asistencia fisioterapéutico para el periodo de inmovilización:

a) Para la disminución de la pérdida de fuerza muscular: auto estiramientos.
b) Para el entrenamiento propioceptivo: movimiento pasivo y activo-asistido.
c) Para la disminución de los efectos de la inflamación durante el periodo agudo: protección, elevación y posicionamiento.
d) Para la recuperación de la resistencia muscular: ejercicios de coordinación y equilibrio.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

61.- En cuanto a la sarcopenia en los ancianos es correcto:

a) Se asocia con cambios intrínsecos del tejido muscular caracterizados por perdida de la masa muscular, de la fuerza y de la calidad de contracción.
b) Aparecen alteraciones debido a la pérdida de proteínas musculares, a los cambios en la proporción de tipos de fibras musculares y en la inervación.
c) Cuando los individuos se aproximas a los 65 años, pierden un tercio de la fuerza de contracción isométrica.
d) Todas son correctas.

62.- Señale la respuesta incorrecta respecto a la osteoartrosis (OA):

a) La osteoartrosis es considerada como la enfermedad reumática más importante.
b) Los pacientes portadores de OA representan aproximadamente un 30 - 40% de la demanda de consultas en ambulatorios especializados en sistema osteoarticular.
c) Generalmente después de la quinta década de vida, toda la población presentará alteraciones articulares degenerativas que predisponen a la OA siendo los hombres los que presentan estas señales más precozmente.
d) Su prevalencia aumenta con la edad.

63.- Señale la respuesta correcta respecto a la suspensoterapia:

a) Suspensión pendular: el punto de anclaje de la suspensión se realiza al aplomo del extremo distal de la extremidad movilizada.
b) Suspensión pendular descentrada: es la única que permite el desplazamiento horizontal.
c) Suspensión pendular excentrada: el punto de anclaje de la suspensión queda en el extremo distal de la extremidad.
d) Suspensión axial: el punto de anclaje de la suspensión queda en la prolongación de la extremidad.

64.- Los músculos cigomáticos mayores realizan la expresión facial de:

a) Sorpresa.
b) Asco.
c) Sonrisa.
d) Beso.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

65.- Durante la quimiotaxis, son mediadores de la respuesta inflamatoria todos excepto:

a) Linfocinas.
b) C5a.
c) Calicreína.
d) Bradicinina

66.- Son contraindicaciones para el uso de bombas de compresión secuencial o intermitente:

a) Hipertensión no controlada.
b) Insuficiencia cardiaca o edema pulmonar.
c) Cáncer.
d) Deterioro de la sensibilidad o del estado mental.

67.- Según Michelle Cameron, señale la respuesta correcta en cuanto a la aplicación de baños de contraste:

a) Un contenedor se llenará con agua caliente o templada entre 30 y 35ºC.
b) Otro contenedor se llenará con agua fría o fresca entre 5 y 10ºC.
c) Se sumergirá la zona a tratar en agua caliente durante 2 minutos, luego en agua fría durante 1 minuto.
d) El tratamiento total será de 25 – 30 minutos de duración, finalizando la sesión con una inmersión en agua caliente.

68.- En cuanto al calor especifico según Michelle Cameron señale la respuesta incorrecta:

a) El calor específico es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un peso determinado de un material un número concreto de grados.
b) La piel tiene un calor específico menor que la grasa o el hueso.
c) El agua tiene un calor específico mayor que el aire.
d) Los materiales con un calor específico alto mantienen más energía que los materiales con un calor especifico bajo estando los dos a la misma temperatura.

69.- ¿Qué es la prosopagnosia?:

a) Dificultad del paciente para reconocer objetos ya conocidos.
b) Dificultad del paciente para reconocer colores y olores.
c) Dificultad del paciente para reconocer caras conocidas.
d) Incapacidad del paciente para reconocer su disfunción.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

70.- Respecto a los volúmenes pulmonares señale la respuesta correcta:

a) Volumen corriente o Tidal (VT): cuando el sujeto esta en reposo es de 800 ml.
b) Volumen de Reserva Inspiratorio (VRI): es aproximadamente igual a 2.500 ml.
c) Volumen de Reserva Espiratorio (VRE): es aproximadamente igual a 1.100 ml.
d) Volumen de Aire Residual (VR): es aproximadamente igual a 2.000 ml.

71.- Los valores de saturación de oxígeno en sangre arterial que indican una desaturación moderada son:

a) Menos de 80%.
b) Valores entre 85 – 80%.
c) Valores entre 89 – 85%.
d) Valores entre 90 – 95%.

72-. Son contraindicaciones de la tos dirigida todas excepto:

a) Enfermedades cavitarias.
b) Sutura traqueal.
c) Fracturas costales
d) Traumatismos intracreaneales.

73.- Respecto al infarto de miocardio señale la respuesta correcta:

a) Es una necrosis isquémica de una parte del miocardio.
b) La mayoría de los infartos de miocardio son provocados por un coagulo de una de las arterias carótidas.
c) El comienzo es frecuentemente durante el esfuerzo.
d) Todas las respuestas son correctas.

74.- Son indicaciones de los programas de Rehabilitación cardiaca todos excepto:

a) Cardiopatías adquiridas.
b) Hipertensión arterial sistémica.
c) Arritmias o taquicardias supraventriculares no controladas.
d) Astenia neurocirculatoria.

75.- Indique cuál de las siguientes técnicas es una técnica inspiratoria lenta para la depuración de las vías respiratorias periféricas:

a) TEF: técnica de espiración forzada.
b) DRR: desobstrucción rinofaríngea retrograda.
c) EI: espirometría incentivada.
d) DA: drenaje autógeno.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

76.- Indique la respuesta incorrecta respecto a la atelectasia según G. Postiaux:

a) Atelectasia significa colapso de las unidades pulmonares periféricas.
b) La atelectasia es la manifestación clínica y radiológica más evidente del síndrome obstructivo.
c) Existe colapso, desinsuflación o aplastamiento de las estructuras.
d) La forma más común de atelectasia es la consecuencia de una obstrucción bronquial, más allá de la cual el gas alveolar se reabsorbe por difusión en la sangre capilar.

77-. El nervio trigémino inerva los siguientes músculos:

a) Buccinador.
b) Frontal.
c) Maseteros.
d) Risorio

78.- En cuanto a los estiramientos musculo-tendinosos según Genot:

a) La técnica de estiramiento debe ser realizada siguiendo los componentes espaciales de las diferentes articulaciones atravesadas.
b) Un musculo puede estirarse un promedio del 40% respecto su longitud en reposo.
c) Los músculos monoarticulares son más fáciles de estirar.
d) Todas las opciones son correctas.

79.- Respecto al uso seguro de equipos de Diatermia, señale la respuesta incorrecta según los servicios de prevención de riesgos:

a) Respecto a la distribución en cabinas de aparatos es conveniente ubicar los equipos en zonas centrales de la misma, procurando evitar las zonas laterales y esquinas.
b) Para minimizar los riesgos de exposición no se debe permanecer en la cabina durante los tratamientos, manteniendo el principio de distancia (a mayor distancia, menor exposición).
c) Evitar o reducir en la medida de lo posible la exposición del trabajador en estados febriles o en terapia con fármacos que afecten a la termorregulacion.
d) Evitar materiales metálicos en el interior de la cabina como pueden ser camillas y sillas metálicas, cadenas o relojes entre otros.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

80.- En relación a los principios éticos básicos en investigación, son elementos de información que deberían comunicarse al potencial candidato para participar en un estudio todas las siguientes EXCEPTO:

a) La descripción de los beneficios para los sujetos y para otros que pueden esperarse razonablemente.
b) La pérdida de beneficios que comporta la renuncia a participar o continuar en el estudio.
c) La posibilidad de consultar con otros profesionales.
d) Las compensaciones previstas en caso de lesión.

81.- Para una miositis en el grupo muscular de los epicondíleos, aplicamos láser de HE-NE en barrido de 50cm2, con una dosis de 8J/cm2. El aparato emite 20 mW eficaces. ¿Cuál es el tiempo total?

a) 20 segundos.
b) 125 segundos.
c) 20000 segundos.
d) 8 segundos.

82.- Diseñamos el electroestimulador una corriente formada por impulsos de 0,5 ms y reposos 10 ms ¿qué frecuencia tiene dicha composición?

a) 20 Hz.
b) 47,53 Hz.
c) 95,23 Hz.
d) 106,83 Hz.

83.- Señale la respuesta INCORRECTA en relación a la evaluación de los músculos del brazo y de la pierna con pruebas isométricas (según Maitland):

a) La extensión de la cabeza sobre la parte superior del cuello, rectos posteriores de la cabeza mayor y menor con el oblicuo menor de la cabeza corresponden a la raíz nerviosa C3.
b) La extensión del pulgar, extensor largo del pulgar corresponden a la raíz C8.
c) La flexión de los dedos del pie corresponde a la raíz S2.
d) La flexión de cadera, iliopsoas, corresponden a la raíz L2.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

84.- Señale los dos puntos débiles de la parrilla abdominal posterior (Según Tixa):

a) El cuadrilátero de Grynfeltt y el triángulo de Jean-Louis Petit.
b) El músculo longísimo torácico (m. longissimus thoracis) y la "punta" de la 12ª costilla.
c) La parte lateral vertebral a 3 cm de la línea media, junto al m. erector spinae en los puntos delimitados por sacro- glúteo menor y por 12ª costilla y "dorsae lumborum".
d) El hiato sacro y el punto de Mc Murray.

85.- De acuerdo a las pruebas clínicas expuestas por "Klaus Buckup", señale la respuesta INCORRECTA:

a) La prueba de Cozen y la prueba de Mill indican epicondilitis lateral.
b) La prueba de Galway es la prueba de desplazamiento de pivote y la prueba de Favere-Patrick indica enfermedad de Perthes.
c) La prueba de "clic" de Mulder indica síndrome de la cintilla iliotibial.
d) El signo de Kernig indica síntomas irritativos radiculares y el signo de Hoffa indica rotura antigua del tendón de Aquiles.

86.- De acuerdo a las pruebas clínicas expuestas por "Klaus Buckup, señale la respuesta INCORRECTA:

a) La prueba de O´Donogues diferencia el dolor de tipo ligamentoso y el Springing test localiza alteraciones funcionales de la columna vertebral lumbar.
b) El signo de Derbolowsky valora una diferencia variable de longitud de los miembros inferiores.
c) La prueba de presión sobre el ilion y el signo de Mennell son ambas indicativas de un trastorno o alteración de la articulación sacroiliaca
d) El signo de Phalen indica neuropatía del nervio mediano y el signo del círculo indica neuropatía del nervio cubital.

87.- Respecto a los indicadores epidemiológicos sobre el nivel de transmisión (incidencia acumulada, positividad y trazabilidad) de la COVID-19 se considera riesgo medio en el indicador "porcentaje de casos con trazabilidad":

a) ≤50% a >30%.
b) ≤65% a >50%.
c) ≤80% a >65%.
d) ≤40% a >60%.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

88.- Respecto a la construcción de indicadores, según la lectura "E. Avellana i Revuelta et al.– La calidad en Atención Primaria de Salud: nuevas perspectivas (II)", señale la respuesta INCORRECTA:

a) Los indicadores basados en una proporción miden un proceso del que esperamos que un cierto porcentaje de los casos lo cumplan.
b) Los indicadores de estructura se refieren a los elementos que nos facilitan la atención como pueden ser los equipamientos, recursos, cantidad y tipos de profesionales.
c) Los indicadores de proceso miden la actividad hecha, generalmente algún paso importante del proceso de atención: diagnóstico, tratamiento, etc.
d) Los indicadores de resultados miden qué le pasa o no le pasa a un paciente como resultado de un proceso que se ha hecho o no. Incluyen complicaciones, efectos adversos o resultados a ciertos tratamientos.

89.- Según Butler, respecto al EPE tradicional (Elevación de la pierna estirada):

a) Es probablemente el test de tensión más conocido.
b) Durante el EPE, las raíces nerviosas lumbosacras se mueven craneal-mente con respecto al agujero intervertebral.
c) Durante el EPE las raíces nerviosas lumbosacras se mueven en direc-ción craneal a la pelvis.
d) Todas son correctas.

90.- Respecto a la clasificación de los tipos de estudio señale la respuesta INCORRECTA:

a) Un estudio se considera analítico cuando su finalidad es evaluar una presunta relación causal entre un factor y un efecto, respuesta o resultado.
b) Se consideran estudios longitudinales los estudios en los que los datos de cada sujeto representan esencialmente un momento del tiempo. Son por definición descriptivos.
c) Se pueden clasificar según el eje "control de la asignación de los factores de estudio" en: experimental u observacional.
d) Se pueden clasificar según el eje "inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos" en prospectivos y retrospectivos.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

91.- De acuerdo a Viladot, son dispositivos ortopédicos que se aplican en los pies con el fin de corregir sus deformidades:

a) Férula de Denis Browne.
b) Férula de Gonzalez Ferré.
c) Férula de Ponsetí.
d) Férula de Thomas- Sequard.

92.- Según Viladot la marcha cuyo aspecto más característico es la inversión del ritmo del paso: el pie entra en contacto con el suelo por el antepié. En la segunda y tercera fase se apoya por las cabezas metatarsianas y el talón y no existe nunca contacto del borde externo con el suelo, se denomina:

a) Marcha con equino del pie afecto.
b) Marcha en el pie plano.
c) Marcha en el pie cavo.
d) Marcha en la metatarsalgia.

93.-Señale la respuesta CORRECTA en relación a las técnicas más usuales utilizadas en amputaciones del retropié según Viladot:

a) La desarticulación de Chopart como técnica aislada, es una mala intervención, ya que tras su realización se plantean problemas importantes.
b) La desarticulación de Ricard realmente es una astragalectomía combinada con una desarticulación a nivel de Chopart, lo cual dificulta su realización.
c) Es preferible efectuar una amputación de Syme cuando es preciso realizar una exéresis del pie en niños en periodo de crecimiento.
d) Todas son correctas.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

94.- En relación a las características estructurales de la clasificación CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud) que tienen un mayor efecto a la hora de su utilización, señale la respuesta INCORRECTA:

a) En el caso de los Factores Ambientales, el primer calificador se utiliza para indicar la extensión de efectos positivos del entorno, ej. facilitadores, y el segundo calificador para indicar la extensión de los efectos negativos, ej. barreras.
b) Los códigos de la CIF sólo están completos con la presencia de un calificador, que indica una magnitud del nivel de salud. Sin calificadores, los códigos no tienen sentido.
c) Para describir la extensión de los problemas en el componente Estructuras y Funciones Corporales y en el componente Factores Ambientales se utiliza el primer calificador, mientras que en el componente Actividades y Participación se utilizan los calificadores de capacidad y desempeño/realización.
d) Las descripciones de los dominios de salud y dominios "relacionados con la salud" hacen referencia a su uso en un momento dado. Sin embargo, se pueden utilizar también en varias ocasiones sucesivas para describir una trayectoria a lo largo del tiempo y del proceso.

95.- Señale la respuesta CORRECTA en relación al decálogo básico de la Fricción Transversa Profunda de Cyriax (J.V.Gallego):

a) La fricción debe hacerse transversal a la estructura dañada, sólo se hace longitudinalmente en caso de bursitis.
b) La fricción debe hacerse por deslizamiento, ya que la movilización de vaivén de los dedos es lo más importante.
c) La presión excesiva produce dolor. Cuanto más dolor sobre la lesión el efecto es mucho más beneficioso.
d) Los tendones deben mantenerse en relajación y los músculos en tensión mientras se aplica la fricción.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

96.- Señale la respuesta CORRECTA (según Kapandji en su 6ª edición)

a) Son los músculos subescapular, infraespinoso y redondo menor que desplazan la cabeza humeral hacia bajo y hacia dentro, formando junto con el músculo deltoides una segunda pareja funcional responsable de la abducción en la articulación glenohumeral.
b) La posición de máxima eficacia del músculo tríceps braquial es en ligera flexión de codo, entre 20 y 30º.
c) La parte larga del músculo tríceps braquial constituye junto con el músculo dorsal ancho una pareja aductora del hombro.
d) Todas son correctas.

97.- Según Kapandji, en relación a las pruebas de actividad de los principales nervios motores que permiten determinar si un tronco nervioso está interrumpido o paralizado, señale la respuesta INCORRECTA:

a) La prueba del nervio mediano consiste en el cierre del puño.
b) La prueba del nervio cubital consiste en la separación y la aproximación con los dedos en flexión.
c) La prueba del nervio radial consiste en la extensión activa de la muñeca, la extensión y la separación del pulgar.
d) La prueba del nervio radial asociada al nervio cubital se diferencia de la anterior por la posibilidad de extender simultáneamente las articulaciones interfalángicas.

98.- Señale la respuesta INCORRECTA en relación a las claves para la prescripción de ejercicio físico en el anciano frágil según "Izquierdo y Casas-Herrero":

a) El entrenamiento de fuerza debería realizarse 2-3 veces por semana, utilizando 3 series de 8 a 12 repeticiones con intensidades que empiecen en el 20%-30% de 1 RM y progresen hasta el 70% de una 1 RM.
b) Los programas multicomponentes deberían de incluir aumentos graduales de volumen, intensidad y complejidad en los ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza muscular y equilibrio.
c) En programas que combinen la fuerza y resistencia cardiovascular, el entrenamiento de resistencia cardiovascular se debe de realizar antes que el entrenamiento de fuerza.
d) La escala de percepción del esfuerzo de BORG es un buen método alternativo para prescribir la intensidad. Utilizando esta escala se recomienda un nivel de intensidad de 12-14.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

99-. Respecto a las herramientas para la mejora de la calidad según lectura "E. Avellana Revuelta, J. Davins Miralles y R. Marquet Palomer", la herramienta que "se usa para desplegar una gran cantidad de información sobre un asunto en concreto de forma condensada y organizada ,que sirve para desplegar de forma visual un efecto y entonces: identificar las causas o factores que contribuyen al efecto; agrupar las causas en categorías o clases; y seleccionar la causa o grupo de causas que han de ser eliminadas o creadas" se denomina:

a) Diagrama de Ishikawa.
b) Técnica nominal de grupo.
c) Diagrama de Pareto.
d) Brainstorming.

100.- Señale cuál de los siguientes cuestionarios, escalas o pruebas son de utilidad en la valoración para pacientes con Fibromialgia:

a) Cuestionario FIQ.
b) Escala EVA.
c) 6 minutos marcha y escala Borg.
d) Todas son correctas.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- Según Cameron, en relación a la restricción de movilidad, SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA:

a) Las causas de los patrones capsulares de restricción de la movilidad incluyen adherencias ligamentosas, desgarros internos o lesiones extraarticulares en la zona de una articulación.
b) Las causas de los patrones no capsulares de restricción incluyen derrame, fibrosis e inflamación de la cápsula articular.
c) El edema intraarticular restringe la movilidad en un patrón capsular.
d) Todas las respuestas son correctas.

2.- Los criterios que desaconsejan la necesidad de una intervención con técnicas de drenaje bronquial según SEPAR son:

a) Pacientes diagnosticados de COVID-19 con hipoxemia severa que requiera intubación.
b) Paciente diagnosticado de COVID-19 con tos seca e improductiva.
c) A y B son correctas.
d) A y B son Falsas.

3.- En la fisiología de la bronquitis crónica encontramos:

a) A nivel bronquial: hipertrofia del musculo liso.
b) A nivel del parénquima: una afectación de la retracción elástica.
c) A nivel de las arterias pulmonares: una disminución endotelial.
d) Todas son correctas.

4.- En una inspiración forzada no intervienen los siguientes músculos:

a) Escalenos.
b) Intercostales internos.
c) Ileocostal lumbar.
d) Esternocleidomastoideos.

5.- Según P. Souchard, con respecto a las "escoliosis antiálgicas", señale la respuesta correcta:

a) El dolor suele ser de origen torácico.
b) Se deben a mecanismos voluntarios de defensa para evitar el dolor.
c) Son llamadas también "falsas escoliosis".
d) Son llamadas "escoliosis esenciales".

Descargado gratis de www.fisioteca.com

6.- Señale la respuesta correcta sobre las diferentes técnicas especiales de masoterapia:

a) La técnica de wetterwald es una técnica de fricción transversa profunda.
b) La técnica de Vogler es una técnica de fricción en el periostio de superficies óseas accesibles.
c) La técnica de Bugnet es un estiramiento de las fascias musculares.
d) La técnica de Rabe son fricciones de la piel con una superficie fría.

7.- El síndrome del pronador redondo se produce a causa de la compresión de:

a) El nervio mediano.
b) El nervio cubital.
c) El nervio radial.
d) Ninguna es correcta.

8.- Señale la opción FALSA en relación al Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo o Método Perfetti:

a) Prefiere las informaciones visuales a las cinestésicas y exteroceptivas.
b) Considera la rehabilitación como un proceso de aprendizaje en condición patológica.
c) Durante la realización del ejercicio, el paciente debe dirigir la atención de forma específica hacia partes o características de su cuerpo.
d) La espasticidad se concibe como la suma de varios síntomas: déficit de reclutamiento motor, reacción de estiramiento, irradiación y esquemas elementales.

9.- Según establece el artículo 6 de la "Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea", son retribuciones complementarias. Señale la respuesta incorrecta:

a) El complemento de destino.
b) El premio de antigüedad.
c) El complemento específico.
d) El complemento de productividad extraordinaria.

Descargado gratis de www.fisioteca.com

10.- Tal y como establece el artículo 20 de la "Constitución Española de 1978", una de las siguientes opciones es correcta.

a) Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

b) Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

c) Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

d) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Descargado gratis de www.fisioteca.com